



ULKOMAILTA TULEVA SYNNYTTÄJÄ

Laatija(t): Kulin, Helena; Löytömäki, Mirja; Miettinen, Anja; Luukkonen, Ritva
Vastuuhenkilö: Löytömäki, Mirja
Hyväksyjä: ayl Ordén, Maija-Riitta

Suomessa **alle** 12 kk asunut ulkomaalainen, turvapaikan hakija tai turisti. Ohje koskee myös ulkomailla työssä käyvää synnyttäjää

Näytteet:

Seuraavat näytteet otetaan ensisijaisesti neuvolassa tai ensikäynnillä sairaalassa

Kaikilta:

- **P-CRP** (4597) **PVKT** (2474), **ALAT** (1024), **HBs-Ag** 1608 (1605), **HCV-Ab** (3815), **HIV-AgAb** (4814), **S-TRPA-Ab** (4942), **cervixin GC** (1506) ja **klamydia** (4807)

Pitkään yskineistä:

- tuberkuloosivärjäys+viljely ysköksestä x 3 (54100)
- thorax -röntgen harkinnan mukaan, konsultoidaan keuhkolääkärää

Ihoinfektioista:

- bakteeriviljely (3492)

MRSA-näytteet

- MRSA (4358)
- ollut ulkomaalaisessa sairaalassa viimeisen 12 kk aikana kts. [ohje MRSA](#)
- Isästä tai tukihenkilöstä ei tarvita erillisiä MRSA tutkimuksia

Sairaalaan lähettäminen; lähetteessä mainittavat asiat:

- mistä maasta äiti tulee
- kieli, tarvitseeko tulkin ja/ tai kuka toimii tulkkina, kts. ohje Tulkin käyttö
- kuuluuko sairaskassaan (KELA) piiriin, jos ei- kuka maksaa hoidon kts. ohjeet
 - Ulkomaalaisten ja muiden itsemaksavien synnytysten hinta
 - 15/2008 Ulkomaalaisten potilaiden laskutus KYS,
 - Menettelyohje venäläisten potilaiden hoidosta 7/2006,
- neuvolassa otetut näytteet ja vastaukset
- infektioanamneesi (esim tuberkuloosi jne), ks ohje Ulkomailta sairaalaan tuleva potilas

Postiosoite

PL 1777
70211 KUOPIO
(017) 173 311

Käyntiosoite

Puijon sairaala
Puijonlaaksontie 2
70210 KUOPIO
(017) 173 311

Alavan sairaala
Kaartokatu 9
70620 KUOPIO
(017) 173 311

Julkulan sairaala
Puijonsarventie 40
70260 KUOPIO
(017) 173 311

Tarinan sairaala
71800 SIILINJÄRVI
(017) 173 311

- hepatiitti; äitiyspoliklinikan läheteohjeiden mukaisesti, kts ohje Äitiyspoliklinikalle lähetettävät potilaat

Kirjaaminen

- Islabin tutkimat positiiviset MRSA tulokset KYS:n sairaanhoitopiirin alueelta kirjautuvat infektiyksikön toimesta Mirandan riskitietoihin
- Jos riskitiedoissa ei ole merkitään positiivista hepatiitti vastauksesta, KYSissä tutkituista positiivista löydöksistä ilmoitetaan infektiyksikköön.
- Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulevat MRSA- ja hepatiittivastaukset kirjataan Mirandan hoitajaksokohtaisiin esitetietoihin ja kirjaaja on ensimmäisenä tiedon havainnut henkilö
- Mirandan keskeisiin tietoihin - raskaus – hoitokokonaisuuden alle maininta ulkomaalaisnäytteiden ottamisesta ja niiden tuloksista

HOITO ENNEN SYNNYTYSTÄ

Äitiyspoliklinikka

- hoito näytevastaukset huomioiden (tavanomaiset varotoimet)

MRSA-positiivinen äiti, ja/tai isä

- varataan päivän viimeinen vastaanottoaika
- odotusaika aulassa mahd. lyhyt (odotus vastaanottohuoneessa)
- kosketuseristysohjetta noudatetaan soveltaen. Kts. ohje [Kosketuseristys](#), [MRSA-ohje](#)

Synnyttämättömien vuodeosasto

- hoito näytevastaukset huomioiden (eristys, verivarotoimet)
- MRSA-positiivinen, hoidetaan aina kosketuseristysohjeiden mukaan, myös isä/tukihenkilö kosketuseristyksessä (näytteitä ei tarvitse)

Hoito synnytyssalissa

- synnytyksen hoito näytevastaukset huomioiden (eristys, verivarotoimet)

Hoito synnytyksen jälkeen vierihoido-osastolla

- MRSA-positiivinen äiti ja lapsi
 - hoidetaan äiti yhdessä vastasyntyneen kanssa kosketuseristyksessä ja otetaan MRSA-näytteet x 2 (nielu, sieraimet, perineum ja vastasyntyneeltä napa) myös jos äiti on altistunut MRSA:lle (esim perheenjäsen on MRSA-positiivinen)
 - näytteet voidaan ottaa vaikka peräkkäisinä päivinä. Jos kaikki näytteet ovat negatiiviset, kosketuseristys voidaan lopettaa
 - tarvittaessa hygieniahoitajan konsultaatio
 - Kts. ohje [MRSA-potilaan kotihoito-ohje](#) ja [Kosketuseristysohje](#)

Vastasyntyneestä huomioitavia asioita:

Calmetointi

- Korkean riskin maista saapuneet vauvat saavat lastenlääkärin tarkastuksen yhteydessä calmette-rokotteen (www.ktl.fi)

PKU-näyte, virtsasta, jos kumpikin vanhemmista alkuperältään muita kun suomalaisia

- virtsanäyte otetaan aikaisintaan 5 vrk iässä. Koska näyte joudutaan lähettämään Helsinkiin eikä se kestä säilytystä, sitä ei voi ottaa perjantaisin eikä viikonloppuisin.
- jos lapsi kotiutuu ennen näytteenottoa, tilaa perheelle hoitajan aika seuraavan viikon vs-pkl:lle. Ajanvarauksen ”lisätietoja”- kohtaan merkintä PKU-seula

A-hepatiitti

- Koskee äitejä, jotka ovat sairastaneet alle 2 viikko ennen synnytystä taudin (lapsella tartuntariski)
- Oma wc, hyvä käsihygienia (virusta erittyä ulosteeseen vielä viikon ajan keltaisuuden alusta)
- Gammaglobuliini lapselle (Gammaglobulin SPR® annos 0.5 ml) kts. ohje A-hepatiitti 2406

B-hepatiitti

- Saa imettää
- Äiti ei saa luovuttaa maitoa
- Akuuttia B-hepatiittia sairastavien ja B-hepatiitin kantajien lähikontaktit (vakituiset seksikumppanit, vastasyntyneet lapset, samassa taloudessa asuvat henkilöt ja eräät muut riskiryhmät saavat B-hepatiittirokotukset ilmaiseksi
- Jos äidillä on tuore B-hepatiitti tai jos äiti on B-hepatiitin kantaja (S-HbsAg 1605 positiivinen), niin lapsella annetaan mahdollisimman pian syntymän jälkeen, 12 tunnin ikään mennessä
 - Hepatiitti B-immunoglobuliini-suojaus: HepBQuin ® 100 KY= 1 ml i.m. (5 ml ampullat, pitoisuus 100 KY/ml, SPR Veripalvelu)
 - Hepatiitti B-rokote: Engerix B® 0.5 ml i.m. (eri paikkaan kuin immunoglobuliini)
 - Jatkossa lapsella annetaan Engerix-rokoteannos 0.5 ml i.m. 1, 2 ja 12 kk iässä neuvolassa
- Lapsen seuranta ja tutkimukset kts. ohje B-hepatiitti 2406
- Jos vain isä on HBV:n kantaja mutta äiti ei ole, tai jos perheessä käytetään ruiskuhuumeita, lapselle aloitetaan rokotesarja mutta immunoglobuliinia ei anneta

C-hepatiitti

- Koskee lapsia, joiden äideillä on HCV-NhO (4314) positiivinen. Lapsen riski saada infektio on n. 6 %.
- Saa imettää (jos rinnanpäävät ovat rikki, imetystä ei suositella. Muu lääkitys tai tupakointi otettava huomioon imetyssuosituksia annettaessa. Kts. ohje Imetys erityistilanteissa
- Äiti ei saa luovuttaa maitoa missään tilanteessa, ei myöskään jos pelkkä HCVAAb on positiivinen
- Lapsen kontrollikäynnit lastenklinikan infektio- ja hepatologiklinikalla, kts. ohje C-hepatiitti 2406

HIV

- Yhteys infektiolääkariin äidin ja lapsen lääkityksen suunnittelua varten
- Yhteys lasten infektiolääkariin lapsen lääkityksen suunnittelua varten
- äidille ja lapselle tarkoituksenmukainen hoito
- **ei saa imettää**
- **ei luovuttaa maitoa**
- jatkot lasten infektiolääkärin ohjeiden mukaan